



ការបង្ហាញអំពីការដាំស្ពៃក្តោប

ការសាកល្បង ការសាកល្បងដាំស្ពៃក្តោប១០គម្រក្នុងជួរដីដោយប្រើប្រាស់ NEB និង១០គម្រក្នុងជួរដីពីរដោយមិនប្រើប្រាស់អ្វីទាំងអស់

ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ វិធីប្រើប្រាស់: ស្រោចទឹក

ល្បាយសូលុយស្យុង: NEB ៣មីលីត្រ/ទឹក១លីត្រ (៣ មីលីលីត្រ/លីត្រ)

កម្រិតក្នុងការប្រើប្រាស់: ស្រោច១០០មីលីលីត្រនៃNEBដែលលាយជាមួយទឹករួច

ការប្រើប្រាស់: ប្រើប្រាស់មួយដងនៅពេលយកដើមដាក់ដាំប្រើសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការដាំគ្រាប់

ការវាយតម្លៃ: ប្រើសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់NEB

ការប្រើប្រាស់ដីនិងគីមី អនុវត្តតាមកម្មវិធីប្រើប្រាស់ដីនិងការការពារសត្វល្អិតតាមធម្មតា

ការណែនាំក្នុងការវាយតម្លៃ វាយតម្លៃស្ពៃក្តោបទាំង១០ក្នុងជួរនីមួយៗ។ ប្រសិនបើអាចវាយតម្លៃទាំងបួសនិងស្លឹក (ដឹកបួសយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នចំណងទឹកអោយអស់ដី)

កំណត់ចំណាំក្នុងពេលវាយតម្លៃ ទំហំនៃស្លឹកនិងផលនៃដំណាំ។ ប្រសិនបើធ្វើការដឹកសូមវាយតម្លៃទៅលើពណ៌និងទំហំនៃបួស។

ការអនុវត្តសម្រាប់ជាពាណិជ្ជកម្ម កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់នេះសម្រាប់តែការសាកល្បងឆាប់រហ័សរយៈពេលប្រើសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីធ្វើការសាកល្បងយកទិន្នផលពិតប្រាកដសូមប្រើប្រាស់NEBតាមកម្រិតដូចដែលបានណែនាំដោយ Agmor។



មិនប្រើប្រាស់ NEB

ប្រើប្រាស់ NEB

ក្តោបនិងស្លឹកធំជាង ការលូតលាស់មានភាពប្រសើរជាង



ការបង្ហាញពីការដាំស្ពៃក្តោប ៩