



ការបង្ហាញអំពីការដាំពោត

ការសាកល្បង ការសាកល្បង១០ដើមក្នុងមួយជួរដោយប្រើប្រាស់ NEB និង១០ដើមក្នុងជួរទីពីរដោយមិនប្រើប្រាស់អ្វីទាំងអស់

ការណែនាំពីការប្រើប្រាស់ វិធីប្រើប្រាស់: ស្រោចទឹក

ល្បាយសូលុយស្យុង: NEB 2.5 មីលីលីត្រ/ទឹក១លីត្រ(2.5 មីលីលីត្រ/លីត្រ)

កម្រិតក្នុងការប្រើប្រាស់: ក្នុងមួយដើមស្រោច100មីលីលីត្រនៃNEB ដែលលាយជាមួយទឹករួច

ការប្រើប្រាស់: ប្រើប្រាស់តែម្តងគត់នៅពេលពាសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការដាំ

ការវាយតម្លៃ: ពាសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់NEB (៦សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការដាំ)

ការប្រើប្រាស់ដីនិងគីមី អនុវត្តតាមកម្មវិធីប្រើប្រាស់ដីនិងការការពារសត្វល្អិតតាមធម្មតា

ការណែនាំក្នុងការវាយតម្លៃ វាយតម្លៃដំណាំទាំង១០ដើមក្នុងជួរនីមួយៗ។ ប្រសិនបើអាចវាយតម្លៃទាំងប្លង់និងស្លឹក (ដីក្នុងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នរួចលាងទឹកអោយអស់ដី)

កំណត់ចំណាំក្នុងពេលវាយតម្លៃ ទំហំនៃដើម ចំនួនស្លឹកនិងផលនៃដំណាំ។ ប្រសិនបើដីក្នុងសូមវាយតម្លៃទៅលើពណ៌និងទំហំនៃប្លង់។

ការអនុវត្តសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់នេះសម្រាប់ការសាកល្បងគាបអ៊ីសូម:ពេលពាសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីធ្វើការសាកល្បងសម្រាប់យកទិន្នផលសូមប្រើប្រាស់ NEB តាមកម្រិតដែលបានណែនាំដោយ Agmor។

	ទម្ងន់ប្លង់ ១០ដើម	ទម្ងន់ស្លឹក ១០ដើម	សរុបប្លង់ + ស្លឹក ១០ដើម
មិនប្រើប្រាស់ NEB	334.2 ក្រាម	2,114.3 ក្រាម	2,448.5 ក្រាម
ប្រើប្រាស់ NEB	674.3 ក្រាម	3,672.3 ក្រាម	4,346.6 ក្រាម

ប្លង់និងដើមធំជាង ការលូតលាស់មានភាពប្រសើរជាង



មិនប្រើប្រាស់ NEB



ប្រើប្រាស់ NEB





ការបង្ហាញអំពីការបណ្តុះគ្រាប់ពោត

កម្រិតក្នុងការប្រើប្រាស់ NEB NEB ៤មីលីលីត្រ/គ្រាប់ពោត១គីឡូក្រាម (ដាក់NEB ដោយផ្ទាល់ទៅលើគ្រាប់)

ការណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់ ដាក់គ្រាប់ពោត១គីឡូក្រាមទៅក្នុងថង់មួយ។ ដាក់ NEB ៤មីលីលីត្រចូលរួចក្រឡុកគ្រាប់ពោតក្នុងថង់ចុះឡើងថ្មមៗ ដើម្បីអោយជ្រាបបានសព្វ (មានពណ៌ស្មើគ្នា)។ គ្រាប់ទាំងនោះអាចយកទៅដាំភ្លាមៗឬរក្សាទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយ។ បរិមាណនៃNEB ដែលបានប្រើប្រាស់ទៅលើគ្រាប់មិនហ៊ានចេញពីគ្រាប់នោះទេ។

ការណែនាំក្នុងការវាយតម្លៃ ពេទៅ៤សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការដាំ។ វាយតម្លៃទាំង១០ដើមក្នុងជួរនីមួយៗ។ ប្រសិនបើអាចសូមវាយតម្លៃទាំងបួសនិងស្លឹក (ជីកបួសយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នរួចលាងទឹកអោយអស់ដី)

កំណត់ចំណាំ កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់នេះសម្រាប់តែការសាកល្បងឆាប់រហ័សរយៈពេលពេទៅ៤សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីធ្វើការសាកល្បងយកទិន្នផលពិតប្រាកដសូមប្រើប្រាស់ NEB តាមកម្រិតដូចដែលបានណែនាំដោយ Agmor។



គ្រាប់ពោតដែលមិនប្រើប្រាស់ NEB

គ្រាប់ពោតដែលប្រើប្រាស់ NEB

បួស ដើមនិងស្លឹកមានការលូតលាស់ធំជាង