



ការបង្ហាញអំពីការដាំប៉េងប៉ោះ

ការសាកល្បង ការសាកល្បងៗ ១០ដើមក្នុងជួរនីមួយៗដោយប្រើប្រាស់NEB និង១០ដើមទៀតក្នុងជួរទីពីរដោយមិនប្រើប្រាស់អ្វីទាំងអស់

ការណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់ វិធីប្រើប្រាស់: គ្រោចទឹក

ល្បាយសូលុយស្យុង: NEB ៥មីលីលីត្រ/ទឹកមួយលីត្រ (៥មីលីលីត្រ/លីត្រ)

កម្រិតក្នុងការប្រើប្រាស់: គ្រោច២៥០មីលីលីត្រនៃNEBដែលលាយជាមួយទឹករួច

ការប្រើប្រាស់: ប្រើប្រាស់តែមួយដងគត់នៅពេលយកដើមដាក់ដាំឬពេលទៅ៤សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីដាំគ្រាប់

ការវាយតម្លៃ: បីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពេលប្រើ NEB

ការប្រើប្រាស់ដីនិងគីមី អនុវត្តតាមកម្មវិធីប្រើប្រាស់ដីនិងការការពារសត្វល្អិតតាមធម្មតា

ការណែនាំក្នុងការវាយតម្លៃ វាយតម្លៃទាំង១០ដើមក្នុងជួរនីមួយៗ។ ប្រសិនបើអាចសូមវាយតម្លៃទាំងបួសនិងស្លឹក (ដឹកបួសយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នរួចលាងទឹកអោយអស់ដី)

កំណត់ចំណាំក្នុងពេលវាយតម្លៃ សង្កេតមើលទំហំនៃបួសកម្រាលនៃដើម ការលូតលាស់និងការអភិវឌ្ឍន៍នៃដំណាំ

ការអនុវត្តសម្រាប់ជាពាណិជ្ជកម្ម កម្រិតប្រើប្រាស់នេះសម្រាប់តែការសាកល្បងជាប់រហ័សរយៈពេលបីសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ការសាកល្បងយកទិន្នផលសូមប្រើប្រាស់សម្រិតNEB ដូចដែលបានណែនាំដោយ Agmor។



ការបង្ហាញអំពីការដាំប៉េងប៉ោះ