



ការបង្ហាញអំពីការបណ្តុះបណ្តាលកូនរុក្ខជាតិ

ការសាកល្បង យកគ្រាប់រុក្ខជាតិ២០គ្រាប់ឬលើសពីនេះដែលមានវ័យលូតលាស់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា៖

១០គ្រាប់សម្រាប់ការអនុវត្តសម្រាប់ជាពាណិជ្ជកម្មដោយមិនប្រើប្រាស់NEB

១០គ្រាប់ទៀតសម្រាប់ការអនុវត្តសម្រាប់ជាពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើប្រាស់NEB

ការណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់ បាញ់ NEB ទៅលើស្លឹកជារៀងរាល់សប្តាហ៍

ស្បាយសូលុយស្យុងទឹកនិងNEB ចំណុះក្នុងការបាញ់៖ NEB 0.5 មីលីលីត្រ/ទឹក១លីត្រ (0.5 មីលីលីត្រ/ទឹក១លីត្រ)

កម្រិតក្នុងការប្រើប្រាស់ បាញ់រហូតទាល់តែស្លឹកទទឹកជោគ (ទឹករៀលធ្លាក់ចុះ)

ការប្រើប្រាស់ជំនិងគីមី អនុវត្តតាមកម្មវិធីប្រើប្រាស់ជំនិងការពារសត្វល្អិតតាមធម្មតា

ការណែនាំក្នុងការវាយតម្លៃ ធ្វើការវាយតម្លៃ៩០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការដាំ។ វាយតម្លៃទាំងបួសនិងស្លឹក (ជីសបួសយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នរួចលាងទឹកអោយអស់ជី)

កំណត់ចំណាំក្នុងពេលវាយតម្លៃ បួសនិងស្លឹកមានការលូតលាស់ធំជាងមុន។ គ្រាប់មានលក្ខណៈរឹងមាំនិងមានសុខភាពល្អជាងមុន។ កាត់បន្ថយពេលវេលា
ក្នុងការដាំរហូតដល់ពេលរួចរាល់ដើម្បីផ្លាស់យកទៅដាក់ដាំនៅក្នុងចំការតែម្តង។



ការបង្ហាញអំពីការបណ្តុះបណ្តាលកូនរុក្ខជាតិក្នុងរយៈពេល៩០ថ្ងៃ