



Pamamaraan sa Pagpunla ng Saging

Disenyo ng Pagsubok Punlaan ng saging, Sampung (10) punla na merong NEB, Sampung (10) punla na walang kemikal

Paraan ng Pag-gamit Paraan ng paglagay: Basain o pag-spray sa dahon (inirerekomenda ang pag-spray)
Paghaluin: 10 ML ng NEB kada 1 litro ng tubig (10 ml / L)
Dami ng pag-apply: Basain sa dami na 100 ml NEB (pinaghalong tubig at NEB) sa bawat halaman
Pag-spray: Mag-spray sa dahon hanggang ito ay tumulo mula sa dahon (basang-basa)
Una gamitin ang NEB sa tissue ng saging bago lumipat sa poly bag.
Suriin ang ginawa pagkalipas ng walong (8) lingo


Pataba at Kemikal Sundin ang nakasanayang paglagay ng pataba at kemikal.

Rekomendadong paraan Ng pagsusuri

1. Pagtubo at pag-unlad ng ugat, tanggalin ang mga lupang nakakapit sa ugat sa pama-magitan ng paghugas gamit ang tubig.
2. Lapad ng puno, taas ng halaman at pamamahagi ng laki (≤ 17 cm and ≥ 18 cm)
3. Haba, lapad at bilang ng dahon

Mga tala sa pagsusuri Mas malaki at advanced na pag-unlad ng ugat at mga dahon. Mga benepisyo: nabawasan ang oras sa nursery na nagpapahintulot sa higit na paglilipat ng imbentaryo sa pagpapabuti ng pagiging produktibo ng nursery, pagbawas ng mga gastos, pagbaba ng dami ng namamatay, pagbawas ng stress ng transplant na shock at pagbutihin ang pag-tatatag ng transplant

komersyal na aplikasyon Ito ay dosis para sa pagsubok lang. Para sa pagsubok ng taniman para magbunga, magapply sa tamang dami ng NEB ayon sa rekomendasyon ng Agmor.



	Ugat	Suloy	Tangkay	Kadahunan	Kabuuan	Taas ng halaman
Walang NEB	12.2 g	110.6 g	106.6 g	26.7 g	256.1 g	21.3 cm
Merong NEB	21.6 g	194.2 g	284.1 g	71.0 g	570.9 g	30.5 cm