



Pamamaraan sa pagtanim ng Repolyo

Disenyo ng Pagsubok Pagsubok ng taniman. Sampung (10) halaman sa isang hilera na merong NEB at sampung (10) halaman sa pangalawang hilera na walang kemikal.

Paraan ng paggamit Paraan ng paglagay: Basain ang halaman Pagtitimpla: I b u h o s a n g 3 mL ng NEB sa bawat isang litro ng tubig (3 ml/L)
Dami: Basain ng 100 mL timpladong solusyon (NEB at tubig) sa bawat halaman
Paglagay: Maglagay ng isang beses sa paglipat tanim o tatlong (3) linggo pagkatapos magtanim
Pagsusuri: Tatlong (3) linggo pagkatapos maglagay ng NEB

Pataba at Kemikal Sundin ang nakasanayang paglagay ng pataba at pestisidyo

Rekomendadong paraan Ng pagsusuri Suriin ang sampung (10) halaman sa bawat hilera. Mas maiging suriin ang ugat at yabong ng dahon (ingatang hukayin ang ugat at hugasan ng tubig)

Mga dapat tandaan sa pag susuri Laki ng dahon at tibay ng halaman. Kung hinukay ang ugat, tingnan ang kulay, laki at salansan nito.

Malawakang paggamit Ito ay dosis para sa mabilisang tatlong (3) linggong pagsubok. Kung tatapusin ang pagsubok hanggat sa maani, maglagay sa tamang dami ng NEB ayon sa rekomendasyon ng Agmor.



Malapad ang ulo, malalagong mga dahon at malusog na pagtubo



Pamaraan sa pagtanim ng Repolyo