



Pamamaraan sa pagpunla ng Kahoy

Disenyo ng Pagsubok Pumili ng dalawampu (20) o higit pang punla ng palm oil sa magka- parehong buo ng antas. Sampo (10) para sa karaniwang malawakang komersyal na walang NEB (hindi nilagyan ng NEB). Sampo (10) para sa karaniwang malawakang komersyal na merong NEB

Paraan ng paggamit Mag-spray ng NEB sa dahon isang beses sa isang linggo

NEB(pinagtunaw ng tubig) Dami ng pag-spray sa dahon: 0.5 ml NEB/1 L tubig(0.5 ml/L)

Dosis/Dami Mag-spray sa dahon hanggang ito ay tumulo mula sa dahon (basang-basa)

Pataba at Kemikal Sundin ang nakasanayang paglagay ng pataba at pestisidyo

Rekomendadong paraan ng pagsusuri Suriin matapos ang siyamnapung (90) araw. Suriin ang ugat at yabong ng dahon (ingatang hukayin ang ugat at hugasan ng tubig)

Mga dapat tandaan sa pagsusuri Mas malaking ayos ng ugat, malaking dahon at patuloy ang tabing. Malusog at masigla ang punla. Mababawasan ang pagpalaki sa punlaan kung saan mabilisan ang paglipat sa taniman.



Pamamaraan sa pagpunla ng Kahoy